

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Mammachirurgie (MC)

Qualitätsindikator	Bundesweiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
Qualitätsindikator: 51846 Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung	>= 95,00 %	97,93 %	97,38 %	97,41 %	↑
Gruppe: HER2-Positivitätsrate					
Qualitätsindikator: 52268 HER2-Positivitätsrate	nicht definiert	13,40 %	13,26 %	14,57 %	**
Qualitätsindikator: 52267 HER2-positive Befunde: niedrige HER2-Positivitätsrate	>= 0,48	0,98 %	0,91	1,01	↑
Qualitätsindikator: 52278 HER2-positive Befunde: hohe HER2-Positivitätsrate	<= 1,70	0,98 %	0,91	1,01	↑
Gruppe: Adäquate Markierung bei nicht palpablen Befunden					
Qualitätsindikator: 212000 Präoperative Drahtmarkierung nicht palpabler Befunde mit Mikrokalk	nicht definiert	81,50 %	82,81 %	*	**
Qualitätsindikator: 212001 Präoperative Drahtmarkierung nicht palpabler Befunde ohne Mikrokalk	nicht definiert	72,82 %	74,13 %	*	**
Gruppe: Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei Drahtmarkierung					
Qualitätsindikator: 52330 Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei mammografischer Drahtmarkierung	>= 95,00 %	99,47 %	99,32 %	99,24 %	↑
Qualitätsindikator: 52279 Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei sonografischer Drahtmarkierung	>= 95,00 %	98,83 %	98,54 %	99,67 %	↑
Qualitätsindikator: 2163 Primäre Axilladisektion bei DCIS	Sentinel Event	0,11 %	0 Fälle	0 Fälle	**
Qualitätsindikator: 50719 Lymphknotenentnahme bei DCIS und brusterhaltender Therapie	<= 5,13 %	4,10 %	6,90 %	5,03 %	↓
Qualitätsindikator: 51847 Indikation zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	>= 90,00 %	96,98 %	94,41 %	95,72 %	↑
Qualitätsindikator: 51370 Zeitlicher Abstand von unter 7 Tagen zwischen Diagnose und Operation	<= 11,67 %	3,22 %	1,71 %	1,60 %	↑
Qualitätsindikator: 60659 Nachresektionsrate	<= 23,01 %	11,32 %	11,25 %	11,50 %	↑
Qualitätsindikator: 211800 Postoperative interdisziplinäre Tumorkonferenz bei primärem invasivem Mammakarzinom oder DCIS	>= 97,04 %	99,37 %	98,98 %	99,18 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850363 Häufige Angabe „HER2-Status = unbekannt“	<= 1,61 %	*	0,69 %	0,19 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850364 Häufige Angabe „R0-Resektion = es liegen keine Angaben vor“	<= 0,84 %	*	0,19 %	0,17 %	↑

Qualitätsindikator	Bundesweiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
Auffälligkeitskriterium: 813068 Häufige Diskrepanz zwischen prätherapeutischer histologischer Diagnose und Angabe im Feld Histologie unter Berücksichtigung der Vorbefunde	<= 4,00 Fälle	*	18,00 Fälle	13,00 Fälle	↓
Auffälligkeitskriterium: 850372 Häufige Angabe „immunohistochemischer Hormonrezeptorstatus = unbekannt“	<= 0,91 %	*	0,19 %	0,19 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 852000 Häufige Angabe des unspezifischen ICD-O-3-Kode 8010/3 im prätherapeutischen histologischen Befund	<= 25,08 %	*	8,32 %	*	↑

Legende
* Indikator in dieser Form nicht existent
** Keine Aussage über Tendenz möglich
↑ Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓ Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches
Planungsrelevante Qualitätsindikatoren (PlanQI)